

Datos descriptivos del perfil de dificultades referidas por las familias atendidas en el Servicio Psicoterapéutico a la Postadopción (SAFAYA).

MUESTRA

N≈ 1000 Población total de personas adoptadas en Navarra

n= 65 Población muestra de hijos pertenecientes a familias adoptivas atendidas en Psicoterapia (38 Familias)

A lo largo y según nuestra experiencia en el servicio post adoptivo, hemos recogido datos estadísticos descriptivos del perfil de dificultades, tanto referidas por las familias atendidas en el Servicio Psicoterapéutico a la Postadopción (SAFAYA) como observadas por las profesionales del mismo.


En un contexto protegido y tras haber conseguido la vinculación necesaria con los menores y sus familias en la intervención terapéutica, hemos querido contabilizar las experiencias traumáticas en los menores. También los aspectos que destacan en cuanto a que muestran el sufrimiento, dolor y necesidades con que acuden las familias en busca de ayuda terapéutica, dada la dureza de la adaptación familiar sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde los fantasmas del pasado asoman e interfieren en la maduración de los menores.

Con ello pretendemos conocer mejor el perfil con el que nos encontramos en terapia para mejorar tanto nuestros recursos e intervención en el contexto terapéutico, como la adecuación del Servicio a dicha demanda y necesidades detectadas.

	FAMILIA ADOPTIVA					
	Síntomatología Depresiva		Síntomas Somáticos		Psicopatología Diagnosticada	
	Padre	Madre	Padre	Madre	Padre	Madre
TOTAL	19	32	22	31	11	23
Nº Casos	31	37	31	37	31	37
%	61,29	86,48	70,96	83,78	35,48	62,16

	HIJOS								
	Sintom. Depres.	Psicop. Diagnost.	Idea. suicida mencionada	Intento suicidio	Abuso sexual	Violencia familiar	Negligencia		Fugas
							Parental	Marental	
TOTAL	51	41	24	13	35	61	28	43	27
Nº Casos	65	65	65	65	61	65	57	63	65
%	78,46	63,07	36,92	20	57,37	93,84	49,12	68,25	41,53

RIESGO DE SUICIDIO EN LOS HIJOS



DESCRIPCIÓN DE ITEMS OBSERVADOS

Síntomatología depresiva: Verbalización de haber pasado un estado de ánimo bajo, baja laboral o sensación de habérsela tenido que coger, periodo amplio de malestar personal con contacto médico y medicación en la que no han podido realizar una vida normalizada

Abuso sexual: Verbalización familiar de tener noticia o referencia del/a menor, o en su historia, de algún episodio de abuso sexual inespecífico, desde tocamientos a penetración, implicando el abuso de poder de adulto, o persona de superior edad, hacia el/a menor

Violencia intrafamiliar: Clima de tensión y agresión verbal familiar intenso.

Negligencia: Incapacidad temporal para el cuidado emocional y protección a los hijos.

Riesgo de suicidio: Incluye la ideación suicida mencionada así como los menores con intentos realizados.

CONCLUSIONES

De los datos recogidos de la muestra referida, podemos extraer que, en las figuras parentales, se da una elevada sintomatología depresiva, especialmente en las madres, que son las principales demandantes del servicio, dando un promedio de presencia total de la misma del 74 %. En un 50 % de las familias se da presencia de psicopatología diagnosticada en uno de sus miembros. En prácticamente la totalidad de los hijos atendidos, destaca la vivencia de un clima de tensión y agresión verbal familiar intenso, así como sintomatología depresiva en el 78% de ellos. 35 de ellos han sufrido abuso sexual a lo largo de su historia, siendo 13 de ellos chicos y 22 chicas. En la mitad se ha detectado una situación de negligencia en su cuidado emocional y protección, con un riesgo de suicidio en ellos del 37%, de los que, en el 20%, se ha confirmado el intento. Dado que el 66 % de los hijos atendidos tienen entre 12 y 19 años encontramos que, dicha sintomatología, asociada también a la crisis de la superación de la etapa adolescente, en nuestra población adoptada, se ve agudizada significativamente.

Aut.: Ochoa de Alda, I.; Ormaechea, O; Setuain, A.R; Gómez, M.J; Iparraguirre, L